

Gesamtbewertung: Berechnung mit Median

Projekt: WRRL Äußere Küstengewässer Phytobenthos SH

Wasserkörper	Jahr	Basisparameter		Begleitparameter					BALCOSIS Gesamtbewertung
		Tiefengrenze von <i>Fucus</i> spp.	Tiefengrenze <i>Zostera marina</i>	Opportunisten im Phytal	Opportunisten im Seegrassbestand	Artenreduktion	Biomasseanteil <i>Furcellaria</i>	Dominanz von <i>Fucus</i> spp.	
Außenschlei	2006	0,37	0,35	0,65	0,79	0,71	0,90	0,51	0,51 - mäßig
	2007	0,37	0,35	0,62	0,82	0,71	0,82	0,55	0,55 - mäßig
	2008	0,37	0,35	0,72	1,00	0,71	0,53	1,00	0,53 - mäßig
	2009	0,34	0,34	0,75	1,00	0,71	1,00	0,60	0,60 - gut
	2010	0,34	0,34	0,88	1,00	0,71	1,00	1,00	0,71 - gut
	2011	0,37	0,35	0,78	1,00	0,80	0,64	1,00	0,64 - gut
	2012	0,37	0,35	0,80	1,00	0,71	0,88	1,00	0,71 - gut
Bülk	2006	0,36	0,37	0,80	0,79	0,47	0,20	0,80	0,37 - unbefriedigend
	2007	0,36	0,37	0,79	1,00	0,54	0,20	0,89	0,37 - unbefriedigend
	2008	0,35	0,42	0,80	1,00	0,54	0,20	0,66	0,42 - mäßig
	2009	0,35	0,42	0,80	1,00	0,54	0,20	0,80	0,42 - mäßig
	2010	0,35	0,42	0,98	0,68	0,60	0,20	1,00	0,42 - mäßig
	2011	0,23	0,47	0,65	0,55	0,60	0,20	1,00	0,47 - mäßig
	2012	0,23	0,47	0,52	0,56	0,71	0,20	1,00	0,47 - mäßig
Eckernförder Bucht Rand	2006	0,27	0,50	0,62	0,80	0,80	0,20	0,47	0,50 - mäßig
	2007	0,27	0,50	0,53	0,44	0,60	0,20	0,51	0,44 - mäßig
	2008	0,33	0,42	0,72	1,00	0,60	0,20	0,31	0,42 - mäßig
	2009	0,31	0,40	0,80	1,00	0,71	0,20	0,20	0,40 - mäßig
	2010	0,31	0,40	1,00	1,00	0,54	0,20	0,20	0,40 - mäßig
	2011	0,24	0,59	1,00	1,00	0,71	0,20	0,42	0,59 - mäßig
	2012	0,24	0,59	0,73	0,71	0,71	0,20	0,54	0,59 - mäßig
Fehmarn Belt	2006	0,48	0,43	0,47	0,79	0,40	0,00	1,00	0,47 - mäßig
	2007	0,48	0,42	0,60	0,82	0,71	0,68	0,45	0,48 - mäßig
	2008	0,48	0,45	0,60	0,80	0,71	0,84	1,00	0,60 - gut
	2009	0,42	0,42	0,80	1,00	0,60	1,00	0,80	0,60 - gut
	2010	0,42	0,42	0,60	1,00	0,60	1,00	0,60	0,60 - gut
	2011	0,53	0,44	0,72	0,80	0,60	1,00	0,92	0,60 - gut
	2012	0,53	0,44	0,69	1,00	0,71	1,00	0,54	0,54 - mäßig
Fehmarn Sund	2006	0,00	0,50	0,47	0,52	0,60	0,20	0,00	0,47 - mäßig
	2007	0,00	0,50	0,16	0,82	0,60	0,20	0,00	0,20 - unbefriedigend
	2008	0,29	0,50	0,20	1,00	0,60	0,20	0,68	0,50 - mäßig
	2009	0,26	0,42	0,78	1,00	0,54	0,00	0,20	0,42 - mäßig
	2010	0,26	0,42	0,60	0,59	0,47	0,20	0,20	0,42 - mäßig
	2011	0,24	0,47	0,27	0,80	0,60	0,20	0,40	0,40 - mäßig
	2012	0,24	0,47	0,40	0,73	0,54	0,20	0,41	0,41 - mäßig
2013	0,24	0,46	0,32	0,76	0,6	0,5	1	0,46	

2013	
Wasserkörper	ökologischer Zustand
Flensburger Innenförde	0,36 unbefriedigend
Geltinger Bucht	0,57 mäßig
Außenschlei	0,70 gut
Eckernförder Bucht Rand	0,48 mäßig
Bülk	0,48 mäßig
Probstei	0,48 mäßig
Putlos	0,48 mäßig
Fehmarn Sund	0,46 mäßig
Fehmarn Belt	0,54 mäßig
Grömitz	0,00 schlecht
Neustädter Bucht	0,23 unbefriedigend

Wasserkörper	Jahr	Basisparameter		Begleitparameter					BALCOSIS Gesamtbewertung
		Tiefengrenze von <i>Fucus</i> spp.	Tiefengrenze <i>Zostera marina</i>	Opportunisten im Phytal	Opportunisten im Seegrassbestand	Artenreduktion	Biomasseanteil <i>Furcellaria</i>	Dominanz von <i>Fucus</i> spp.	
Flensburg Innenförde	2007	0,25	0,33	0,31	0,82	0,19	0,00	0,55	0,31 - unbefriedigend
	2008	0,26	0,33	0,00	0,80	0,00	0,00	0,43	0,26 - unbefriedigend
	2009	0,26	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00	0,48	0,26 - unbefriedigend
	2010	0,26	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,26 - unbefriedigend
	2011	0,24	0,32	0,60	1,00	0,20	0,00	0,96	0,32 - unbefriedigend
	2012	0,24	0,32	0,15	1,00	0,20	0,00	1,00	0,24 - unbefriedigend
Geltinger Bucht	2006	0,26	0,41	0,68	0,60	0,47	0,00	0,74	0,41 - mäßig
	2007	0,26	0,41	0,60	0,54	0,54	0,20	0,00	0,41 - mäßig
	2008	0,31	0,51	0,70	0,71	0,80	0,20	0,70	0,51 - mäßig
	2009	0,30	0,38	0,80	1,00	0,40	0,24	0,40	0,40 - mäßig
	2010	0,30	0,38	1,00	1,00	0,71	0,43	0,67	0,43 - mäßig
	2012	0,30	0,50	1,00	0,80	0,80	0,49	0,49	0,50 - mäßig
Grömitz	2006	0,00	0,41	0,02	0,44	0,34	0,20	0,00	0,20 - unbefriedigend
	2007	0,00	0,41	0,00	0,82	0,27	0,20	0,00	0,20 - unbefriedigend
	2008	0,00	0,49	0,00	0,59	0,27	0,20	0,00	0,20 - unbefriedigend
	2009	0,00	0,40	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0 - schlecht
	2010	0,00	0,40	0,23	0,49	0,34	0,20	0,20	0,23 - unbefriedigend
	2012	0,00	0,45	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0 - schlecht
Neustädter Bucht	2006	0,00	0,38	0,07	0,60	0,47	0,25	0,00	0,25 - unbefriedigend
	2007	0,00	0,39	0,00	0,56	0,27	0,20	0,00	0,20 - unbefriedigend
	2008	0,00	0,42	0,03	0,30	0,34	0,20	0,00	0,20 - unbefriedigend
	2009	0,00	0,43	0,00	0,80	0,20	0,00	0,00	0 - schlecht
	2010	0,00	0,43	0,35	1,00	0,40	0,20	0,00	0,35 - unbefriedigend
	2012	0,23	0,41	0,00	0,36	0,00	0,00	1,00	0,23 - unbefriedigend
Probstei	2006	0,32	0,37	0,78	0,79	0,71	0,56	0,68	0,56 - mäßig
	2007	0,41	0,37	0,58	1,00	0,71	0,67	0,56	0,56 - mäßig
	2008	0,41		0,59		0,60	0,60	0,87	0,56 - mäßig
	2009	0,36	0,42	0,79	0,75	0,60	0,28	1,00	0,42 - mäßig
	2010	0,36	0,42	0,68	0,80	0,71	1,00	0,91	0,68 - gut
	2011	0,34	0,44	0,78	0,59	0,60	0,43	1,00	0,44 - mäßig
	2012	0,34	0,44	0,73	0,58	0,71	0,32	1,00	0,44 - mäßig
Putlos	2006	0,32		0,51		0,71	0,30	0,90	0,41 - mäßig
	2007	0,36		0,60		0,54	0,20	0,60	0,45 - mäßig
	2008	0,39		0,60		0,54	0,20	0,73	0,46 - mäßig
	2009	0,34		0,79		0,54	0,32	0,45	0,41 - mäßig
	2010	0,34		0,98		0,60	0,46	0,91	0,54 - mäßig
	2011	0,33		0,80		0,60	0,36	0,68	0,48 - mäßig
	2012	0,33		0,80		0,60	0,28	1,00	0,47 - mäßig
2013	0,33		0,62		0,71	0,24	0,77	0,48	